

性耳鸣计有急性卡他性中耳炎3耳、慢性卡他性中耳炎5耳、炮震性耳鸣5耳、神经性耳鸣13耳、突发性耳鸣1耳。

病程一年以内10耳、2年以内8耳、4年以内2耳、5年以内4耳、6年以内4耳、11年以内1耳。

二、治疗效果

1. 病效标准

治愈：耳鸣完全消失，睡眠好，记忆力正常。

显效：耳鸣消失50%以上，睡眠好，记忆力提高。

有效：耳鸣消失20~50%。

无效：耳鸣无改变。

* * * * *

· 文摘 ·

锂盐与消炎痛、阿司匹林

锂是一种治疗范围狭窄的药物，即使锂的肾清除率略有改变，其治疗作用和毒性反应均有明显影响。前列腺素合成抑制剂可改变肾电介质的排泄，因而可能影响锂的肾排泄。现在已用阿司匹林和消炎痛对此进行了研究，因为两药已知均能减少前列腺素E₂的尿排泄率。

10名女性受试者各自服用锂直至稳态血浆浓度达到0.5~0.8mEq/L。然后受试者应用安慰剂、阿司匹林(1g, 每天4次)或消炎痛(50mg, 每天3次), 连服10天。

结果表明, 阿司匹林和消炎痛均可明显减少前列腺素E₂的尿排泄率。而且进一步观察到阿司匹林能使钠的清除率减少13%及锂的清除率增加6.4%,

而消炎痛能增加钠的清除率9.4%及锂的清除率减少23.3%。后者的影响导致锂的血浆浓度从0.6升高至0.84mEq/L。

值得注意的是阿司匹林和消炎痛对钠和锂清除率的影响有差异, 从而表明并非所有的前列腺素合成抑制剂都具有同样的效应。

此研究的实际意义是病人在用锂治疗时不宜并用消炎痛, 但是阿司匹林则适用于需要抗炎剂或血小板抗凝剂而又同时需要锂治疗的病人的服用。

[AJP《澳大利亚药学期刊》, 64(764): 793, 1983(英文)]

苏开仲译 张紫洞校

甲磺丁脲与食物的相互作用

食物摄取对甲磺丁脲吸收的影响已在糖尿病受试者中进行研究。除测定甲磺丁脲的血清浓度外, 还监测了进餐后血中胰岛素和葡萄糖的浓度, 从而确定标准餐与不同时间应用甲磺丁脲所产生的任何药理作用变化的关系。

15名糖尿病受试者各自受接(a)于标准餐前30分钟服用甲磺丁脲(口服500mg), (b)于就餐前即刻服用甲磺丁脲(口服500mg)及(c)就餐时同服安慰剂。采集血样, 并分析甲磺丁脲、葡萄糖和胰岛素的浓度。

结果表明, 食物对甲磺丁脲的吸收有可测得的

但无重大的影响。就餐时服药可使本品的吸收程度降低6%, 但并无临床或治疗学的意义。进餐前血清葡萄糖和胰岛素浓度的分析也证实, 当食物与甲磺丁脲同时, 甲磺丁脲的药效学不受影响。

作者认为, “糖尿病志愿受试者进食标准餐与甲磺丁脲的给药时间关系表明, 对该药的生物利用度或药效学特点均无显著影响。因而服用甲磺丁脲时不必考虑进餐的时间。”

[AJP《澳大利亚药学期刊》, 64(762): 644, 1983(英文)]

苏开仲译 戴诗文校