

血化淤的结合系微观与宏观的统一,将对机体内调节控制的研究作出新贡献。微循环观测作为血淤症的一项诊断方法并对活血化淤法则(包括西药抗凝、溶栓疗法)所起的指导和效果判定已是无可置疑的,特别是为提

高危重病和疑难症的治疗效果方面可能开辟一条新途径,在创立祖国新医学药理学理论方面将具有光辉的前景。

(参考文献42篇略)

复方花粉多维片治疗前列腺病和慢性胃炎360例效果观察和研究

解放军第208医院 张俊 杨世英 郭祥林

我院研制的复方花粉多维片治疗前列腺病和慢性胃炎、动脉硬化和神经衰弱等多种疾病,并有抗衰老等多种功能作用。现就我院1984年2月~1988年7月资料完整的前列腺病180例和慢性胃炎180例(其中萎缩性胃炎80例)效果观察报告如下。

病例选择:均为我院门诊患者,经多种检查结合病史症状和体征确诊为前列腺病180例和慢性萎缩性胃炎80例,慢性浅表性胃炎100例。前列腺病组:年龄48~65岁,平均为58.2岁均为男性。胃炎组:萎缩性胃炎年龄25~64岁,平均为47.6岁,男68例女12例。浅表性胃炎年龄21~55岁,平均为34.5岁,男65例女35例。

药物成份:每片0.5,内含精制长白山

花粉0.3765、维生素C0.0445、维生素E0.02、维生素B0.009、甜菊甙0.01、红豆粉、糊精、硬脂酸和淀粉均为适量。

治疗方法:每日二次,早晚每次一片内服。

前列腺组2个月为一疗程、胃炎组1~2个月为一疗程。

治疗组与对照组治疗结果

(一)前列腺病组:前列腺病根据症状体征各种化验检查,结合下列几项,即可诊断本病。

观察方法:服用本方二周后开始记载。疗程结束后,判定疗效结果,见表1、2及表3。

表1 前列腺炎治疗组(120例)与对照组(60例)疗效对比观察

判定	腰部酸痛		下腹部隐痛		会阴部不适		尿频		尿急		有效率%	
	治疗组	对照组	治疗组	对照组	治疗组	对照组	治疗组	对照组	治疗组	对照组	治疗组	对照组
	108	52	96	39	110	54	64	36	74	38		
消失	94	37	92	24	98	38	54	21	72	20		
好转	14	9	4	12	6	9	6	8	2	14		
无效		6		3	6	7	4	7		4		
有效率	100	88.50	100	92.30	94.55	87.04	93.75	80.60	100	89.50	97.66%	87.59%

注:(1)复方花粉多维片有效率高男康片10.07%,治疗满意。

(2)对照组服用男康片(此产品系山西平阳制药厂产品)。

表2 120例患者前列腺液用药前后检查结果

项目	卵磷脂小体/450X (平均视野)		白细胞数/450X (平均视野)	
	++ 以下	++ 以上	10个以下	10个以上
用药前	64	56	3	117
用药后	4	116	68	52

从以上两表可以看出该药对前列腺炎的治疗是令人满意的。

表3 前列腺良性肥大治疗组(60例)与对照组40例疗效对比观察

判定	排尿困难		尿线无力		尿频		尿滞留		有效率%	
	治疗组	对照组	治疗组	对照组	治疗组	对照组	治疗组	对照组	治疗组	对照组
	52	38	58	38	54	36	9	6		
消失	45	16	54	23	30	28	8	4		
好转	7	4	4	10	21	8	1	1		
无效		8		5	3					
有效率	100	78.95	100	86.84	94.40	100	100	83.33	98.60	87.28

注: (1) 复方花粉多维片治疗有效率高于己烯雌酚11.32%。

(2) 对照组服用己烯雌酚(此药系上海信谊制药厂产品)。

前列腺增大标准, 即鸡蛋大为一, 鸭蛋大小为二, 鹅蛋大小为三。触之表面光滑, 旁界清楚, 质地柔韧而有弹性感, 无

石样坚硬和结节状, 排除前列腺癌。观察结果见下表:

项目	例数	恢复正常	缩小2/3	缩小1/3	无效	有效%
一级	30	22	5	1	2	93.3
二级	20	11	3	4	2	90.0
三级	10	4	2	1	3	70.0

对前列腺肥大治疗后总有效率为84.4%, 效果也是令人满意的。

前列腺液涂片复查结果: 红白细胞和卵磷小体疗程结束后98%恢复正常。

【附病例1】

钟某从72年开始有腰部酸痛, 下腹部隐痛, 会阴部不适。伴尿痛, 前列腺液常规化验小体+, 脓细胞+++、诊断慢性前列腺炎, 曾在我院住院治疗, 经用中药野菊花栓和中药治疗, 一直无好转, 自85年开始感到有进行性排尿困难, 尿线无力, 并有尿频, 每天

排尿20余次, 肛诊, 前列腺II度肥大, 诊断前列腺良性肥大, 合并前列腺炎。经服用男康片、克念菌素和中药近百副仍不见好转。自86年6月开始服用复方花粉多维片, 服用二周症状开始减轻, 二个疗程自觉腰腹部疼痛会阴不适消失, 前列腺缩小I度肥大, 尿频也好转, 每天约6~8次, 前列腺液常规化验小体++, 脓细胞8~10/高。

注: 此标准系总后卫生部《临床疾病诊断依据治愈好转标准》。

(二) 胃炎组诊断标准和疗效标准判定

均按慢性胃炎标准判定,于治疗前均有胃镜检查
和病理证实为慢性萎缩性胃炎80例和慢性
浅表性胃炎100例,计180例。治疗萎缩性
胃炎80例,治疗期间停药其他一切药物。

方法:复方花粉多维片0.5,一日二次,
早晚内服,2周观察并记录为80例,标准判

定分为显效、好转和无效;临床消化道症状
全部消失或显著减轻,并有体重增加者显
效;大部分消化道症状消失或明显减轻,但
在观察期间有时尚有个别不适症状存在者为
好转;服药后二个月消化道症状无变化者判
为无效。结果见下表:

例数	疗效	显效 (%)	好转 (%)	无效 (%)	总有效率 (%)
80		53 (66.25)	24 (30.00)	3 (3.75)	96.25

上表可以看出有效率在96.25%,结果
是满意的。病人在服药一周后症状有好转,
四周后胃脘痛和上腹压痛、恶心、失眠逐渐
消失。食欲不振多在二周后思饮食量增加。
有的患者治疗前每餐仅食2两饭,治疗后增

加至4两,体重也随之上升,二个月后增加
3公斤。多数病人由于症状的消失,精力充
沛,解除了恶变的恐惧心理。

慢性萎缩性胃炎胃镜复查结果(均在4
~8周后)见下表:

例数	炎症消失(治愈) (%)		好转 (%)		无效 (%)		总有效率
	治疗组	对照组	治疗组	对照组	治疗组	对照组	
80	31 (38.75)		42 (52.50)		7 (8.75)		91.25
40		11 (27.50)		19 (47.50)		10 (25)	75.00

注:(1)复方花粉多维片有效率高
于维酶素16.25%,治疗效果满意。

(2)对照组服用维酶素(此产品系
郑州制药厂产品)。

(3)维酶素一日三次每次内服五片,
服四周同上检查胃镜判断结果。

胃镜检查治疗前情况均有胃粘膜充血
水肿、糜烂、发白和灰白、黄白、变薄、
血管可见,经两个月后复查结果,粘膜充
血水肿糜烂消失,红白相间以红为主,炎
症消失判为治愈。弥漫性红白不均,以白
为主,变为局限性呈片条状,充血和水肿
消失为好转;粘膜无变化者判为无效。治
疗后效果为91.25%也是满意的。以上均
说明复方花粉多维片,治疗萎缩性胃炎有
较好的疗效。

慢性浅表性胃炎100例诊断标准和疗效
标准判定,按慢性胃炎标准判定,均有胃
镜检查和病理检查,胃粘膜组织为慢性炎
症细

胞浸润等改变,诊断为慢性浅表性胃炎。
服药方法同上。四周至八周为一疗程,症
状和体征的改善见下表:

症状及体征	例数	消失 (%)	好转 (%)	无效 (%)	有效率 (%)
上腹痛	96	86 (89.58)	6 (6.25)	4 (4.17)	95.83
腹胀	84	78 (92.86)	4 (4.76)	2 (2.38)	97.62
返酸	64	60 (93.75)	4 (6.25)		100.00
嗝气	82	80 (97.56)	2 (2.44)		100.00
上腹压痛	76	62 (81.58)	12 (15.79)	2 (2.63)	97.37
食欲增加	95/100				95.00
体重增加	88/100				88.00

上表可见症状和体征的改善, 均为 和88%。
98.16%以上, 食欲和体重增加分别为 95% 浅表性胃炎100例胃镜复查结果见下表:

例数	炎症消失(治愈)(%)		好转(%)		无效(%)		总有效率%
	治疗组	对照组	治疗组	对照组	治疗组	对照组	
100	38 (38)		52 (52)		10 (10)		90
50		16 (32)		23 (46)		11 (22)	78

注: (1) 复方花粉多维片有效率高于呋喃唑酮12%, 治疗效果满意。

(2) 对照组服用呋喃唑酮(此产品系辽宁省金州制药厂产品)

(3) 呋喃唑酮第一周内服, 一日三次, 每次0.2, 第二周内服, 一日三次, 每次0.1, 二周为一疗程, 疗效观察同上。

疗程结束后经胃镜复查粘膜充血和水肿、糜烂局限性发红(片、条状)和点状发红消失为治愈; 充血水肿消失, 但仍有红白不均, 以红为主者为好转; 无变化者为无效。从上表可见本方剂治疗浅表性胃炎疗效理想。炎症消失在90%以上, 症状和体征的改善在96.26%, 更为令人满意。

讨 论

1. 复方花粉多维片对前列腺病和慢性胃炎的治疗效果满意, 可见本方剂是一种理想的药物。日本和瑞典学者都证明花粉制剂治疗前列腺炎和前列腺肥大疗效达80%, 本文为91.03%优于国外报道, 前列腺疾病久服可获良效。对慢性胃炎的治疗效果更为理想。对慢性萎缩性胃炎治愈率在91.25%以上和文献报道相同。浅表性胃炎症状和体征的改善均在98.16%以上, 效果更为理想。

2. 本方剂中中长白山区花粉每片含量(0.3765g), 具有丰富的营养成分, 蛋白质高达25%, 有22种必需的氨基酸, 是一种氨基酸的浓缩体, 其含量比牛肉、蛋类、干酪多5~7倍⁽¹⁾, 还含有维生素、糖和天然活性酶、微量元素、类激素物质, 还有其

他未明成份。天然花粉对胃肠有特殊疗效⁽²⁾, 每100g花粉中含核黄素1670微克, 核黄素可参与细胞的呼吸和代谢, 解毒等功能。复方花粉多维片治疗胃炎能控制炎症, 防止胃粘膜上皮萎缩, 防止不典型增生和肠化发生发展, 并能使胃粘膜炎症消失修复, 起到对胃炎的治疗作用。

3. 除治疗前列腺病和胃炎外, 本方剂对心血管疾病、神经衰弱、增强体力、促进性功能等亦有良效。久服本方剂除治疗多种疾病外, 尚有抗衰老、延年益寿作用, 是中老年人不可缺少的良药。

参 考 资 料

1. 当代蜜蜂法, 中国养蜂学会 1980, 28页, 中国养蜂学会连云港市科技情报研究所
2. 江鱼等: 前列腺疾病, 1981, 湖北人民出版社
3. 抗老新药花粉, 1983.2, 抗衰老杂志
4. 汪洪志等: 慢性胃炎, 1985.10, 人民卫生出版社
5. 丁杰: 五肽胃泌素治慢性萎缩性胃炎, 1986.12, 全军消化专业学术会议汇编

本刊帐号更改启事

本刊帐号已经更换, 自1989年7月份起, 凡需银行信汇者请用下列新帐号, 敬希协助为荷。

户名: 第二军医大学药学院

帐号: 326—053150426

开户行: 上海农行五角场支行营业所

《药学期报通讯》编辑室