

例5有肝炎病史。我们认为也不能完全排除药物代谢异常而损及肝脏这一原因,由于这6名病人均为口服给药,而异搏定为一在肝内广泛代谢的药物,口服生物利用度仅为20%左右。根据这些报告,对口服异搏定治疗的病人,应密切注意其肝毒性反应。如果病人一旦发生此种反应,应立即停药,一般

无需特殊处理。并在病人病历或药历中载明,以免再用异搏定口服治疗。对患有肝炎病史的病人应慎重用药。有人认为患肝病的病人口服剂量应减少80%,静注剂量减半。建议长期口服异搏定治疗的病人应定期检查肝功能。

(参考文献8篇略)

口服速效伤风胶囊引起过敏一例报告

第三军医大学附属三院药局 柏千荣

速效伤风胶囊是治疗感冒的常用药,特别是对感冒初期效果较好。笔者曾见到1例引起过敏反应值得重视。

患者傅××,女性,20岁。因患上感,口服速效伤风胶囊3次/日,2粒/次,此外未服其它药物。服药第二天,在脸部、口唇周围、颈部出现皮疹伴搔痒、灼热感,患者自行停药。当时由于气候炎热,医生误诊为痱子,经用痱子水治疗后,未见皮疹好转。继又按过敏治疗,口服扑尔敏、葡萄糖酸钙片和外擦炉甘石洗剂数日后而愈。患者在三个月后因再次感冒,又口服速效伤风胶囊2粒,服药后24小时又出现同样的过敏症状,患者当即停用速效伤风胶囊,数日后过敏症状自行消失。

讨 论

本例病人两次口服速效伤风胶囊后均引起皮疹和搔痒,经抗过敏治疗和停药后康复。以后感冒改用其它感冒治疗药,再未见过敏症状发生。该患者健康,无任何药物过敏反应和对食物等的过敏反应史,故上述诊

断无疑。

该药含牛黄、咖啡因、扑尔敏和扑热息痛,从处方内容看,扑热息痛属于解热镇痛药,而解热镇痛药在广泛使用过程中偶见过敏反应,少数病人出现荨麻疹、哮喘等症状。曾有文献报道1例口服扑热息痛片0.5克,10分钟后引起过敏并致完全性房室传导阻滞,而且扑热息痛本身能影响机体免疫系统。因此,笔者认为扑热息痛致敏的可能性最大。建议对乙酰苯胺类药物(包括扑热息痛)过敏者慎用或忌用速效伤风胶囊。由于速效伤风胶囊引起过敏反应的详细机制尚不清楚,因此,使用时应引起警惕(因为处方中含有扑尔敏,所以再引起过敏反应时易被忽视)。特别是目前治疗感冒患者,不管是成人或小孩,首选药主要是速效伤风胶囊和小儿速效感冒冲剂。在这种使用普遍情况下,要求医生在诊治中详细询问病史,如一次用速效伤风胶囊药过敏,应告知患者及家属,今后禁用本药及含扑热息痛药物如小儿速效感冒冲剂、感冒清等,以防过敏反应再次发生。