

族维生素及Vc等。治疗组用654—2 0.5~1 mg/kg/d, 分1~2次加入5~10%G·S 100~200ml静滴, 滴速控制在15滴/分钟, 连用5~7天。待观察指标控制后, 再继续口服654—2, 维持在一周内停药。结果, 治疗组从开始用654—2治疗到尿量增多时间平均为4.2±2.6天。浮肿消退平均为4.8±2.1天, 血压恢复为5.5±1.6天, 尿常规转为正常6.8±3.1天, 比对照组均有明显的缩短。

此外, 报道用654—2治疗并取得一定疗效的疾病尚有新生儿硬肿症、过敏性紫癜、输液输血反应、斑秃、先天性喉骨发育不良、特发性耳聋、肢体抽搐、妊娠中毒症、眩晕病、流行性出血热、偏头痛、血管性头痛、视神经萎缩、眼底动脉阻塞等。

654—2治疗时常见的副作用有口干、面红、轻度扩瞳、视近物模糊、心跳加快、排尿困难、荨麻疹及神经兴奋等, 一般在减量或停药后不久即可缓解消失。青光眼、脑出血急性期患者、前列腺肥大者禁用。

#### 参 考 文 献

1. 袁曼等: 中华传染病杂志 1985, 3(4): 201
2. 周正东: 解放军医学杂志 1987, 12(3): 239
3. 杨国栋等: 中华内科杂志 1985, 24(3): 171
4. 张春峰: 重庆医药 1987, 16(1): 33
5. 孟磊等: 中华内科杂志 1987, 26(5): 275
6. 谭峰等: 实用儿科杂志 1987, 2(1): 27
7. 杨国栋等: 中华内科杂志 1980, 19(4): 303
8. 高从光等: 中华内科杂志 1982, 21(12): 755

9. 毕海祥等: 中国医院药学杂志 1989, 9(1): 14
10. 吴敏: 中国初级卫生保健杂志 1987, 9: 11
11. 刘鼎清: 中西医结合杂志 1987, 7(8): 502
12. 卢建新: 南京医学 1987, 4(2): 36
13. 刘会方等: 中国初级卫生保健杂志 1987, 9: 35
14. 刘世杰等: 中西医结合杂志 1987, 7(6): 359
15. 杨志雄: 人民军医 1984, 1: 44
16. 刘玉杰: 甘肃医药 1986, 6(3): 封三
17. 游鼎元: 中国神经精神病杂志 1984, 10(4): 236
18. 唐浩等: 人民军医 1987, 6: 34
19. 许贻白: 实用内科杂志 1987, 7(3): 144
20. 周英杰等: 实用内科杂志 1982, 2(2): 84
21. 吕淑芳等: 中华内科杂志 1986, 25(1): 10
22. 赵克然: 新医学 1984, 15(6): 217
23. 郑华金等: 中华血液学杂志 1985, 6(7): 430
24. 刘有望等: 福建医药杂志 1987, 9(3): 5
25. 李长春等: 临床医学杂志 1986, 2(3): 176
26. 韩启德等: 西安医学院学报 1985, 6(1): 12
27. 孙文松等: 药学通报 1981, 16(11): 19
28. 沈雪霞: 中级医刊 1983, 12: 12
29. 孙林森等: 中华皮肤科杂志 1985, 18(1): 55
30. 杨文润等: 中国农村医学 1984, 4: 24

#### · 文摘 ·

### 口服氟啶酸治疗肛门或咽淋病

叶金朝摘译 贾秋枫校

作者报道两种剂量方案口服氟啶酸(enoxacin)对比治疗咽或肛门淋病的疗效。

50例确诊为淋病的男性病人: 肛门淋病4例, 咽淋病6例, 肛门和咽淋病4例。随机双盲一次口服氟啶酸400mg或一日两次200mg剂量(每12小时一次)。两组病人呈可比性。治疗后3~5天和7~14天进行临床评价, 肛门和咽拭培养。结果: 44例治疗后3~5天临床症状消失和细菌学治愈, 共

其中包括产生青霉素酶的奈瑟氏淋球菌。两组病人3~5天随访治愈率相同, 7~10天随访相似。未见血液学和生化方面的异常变化。

本文研究表明, 试验期间9个病人有轻微不良反应。氟啶酸400mg一次或分两次口服给药方案治疗肛门或咽淋病均有疗效。

〔Genitourin Med《泌尿生殖医学》, 64(6) 364, 1988(英文)〕