

mg、氟美松1.5mg、猴耳环消炎片3片，每日3次，红霉素0.25克每日4次口服，清凉润喉片服用同前。治疗1天瘙痒症状消失，2天后风疹块消散。喉干、喉痛症状消失，3天后停用猴耳环消炎片与润喉片，接着抗敏、抗感染治疗，5天后水泡、血泡消散，但留下疤痕。1个月后家访无复发，但水泡与血泡留下的疤痕仍存在如初。

四环素为一广谱抗生素，对多数革兰氏阳性和阴性菌均有抑制作用，是临床应用较广泛的抗生素之一。对于四环素的不良反应

已早为临床工作者熟悉，但其过敏反应较为少见，一般仅以皮疹、药热等过敏症状反应于临床。本例过敏反应，症状仅出现于四肢肢端（上肢腕关节以前，下肢踝关节以下），且有水泡和血泡生成，愈后留下疤痕，故笔者认为较一般反应特殊、严重。

水泡和血泡的产生是否与未及时进行抗敏治疗有关？建议临床使用四环素时应详细询问有无过敏史，有过敏史患者应选用其它抗生素，如出现过敏反应时应及时行抗过敏治疗。

## 口服乐得胃片引起血尿一例

解放军256医院药械科 赵树红

患者王某，女性，33岁，因呃气，胃痛4年，口服猴头菌片好转。88年6月因工作劳累，饮食不当，胃痛加重，X光造影诊断为十二指肠球部溃疡，在门诊就医后，口服甲氰咪呱2天，因效果欠佳，改用乐得胃片。患者于当日午饭后口服乐得胃2片，2小时后出现尿痛，尿急、尿量减少。当日晚饭后，又口服2片，1小时后出现躁动不安，腹痛，有下坠感症状，肉眼可见血尿。化验检查，RBC满视野。患者服药后，并无尿急尿频感，也无血尿，故临床诊断为药物引起的急性血尿。患者于当晚饮水约2000ml至下半夜尿痛减轻。次日化验，RBC 3~

5个，第三天，尿常规正常，停药观察一星期，无血尿出现。

讨论：乐得胃片由荷兰进口，是治疗十二指肠溃疡、胃溃疡和胃酸多等胃病的复方制剂（成份：次硝酸铋30mg，次碳酸镁400mg，重碳酸钠200mg，弗郎鼠李皮25mg）。此药在我院用于临床门诊多年，一般认为副作用小。但患者出现的肉眼血尿，无法用其它原因来解释，因第一次口服乐得胃后出现尿痛尿急，第二次口服后症状加重，停用乐得胃后症状消失。故考虑血尿系乐得胃所致，是否是由于此药通过肾脏排泄，从而引起泌尿系统损害，有待进一步探讨。

## 抗菌素治疗对肠道菌群的影响

金伟译 魏水易 张钧校

本文阐述了胃肠道菌谱和功能，抗菌药物对这些菌群的各种影响，以及肠道菌群改变的临床意义。

肠道内正常菌体的主要作用是抑制潜在致病菌移生于胃肠道和过分生长。当给予多种抗菌药物之后，这种保护机制可以受到严