

21例,心电图好转者13例,总有效率达72.24%。

综上所述:不论是属于何种类型的老药新用,都有着利弊两方面。为了更好地研究运用老药新用,笔者建议将老药新用分为三个不同类型:

(一)、一线药物:指那些临床报道较多,疗效肯定,副作用较少的老药新用;包括苯巴比妥治疗体质性黄疸;ATP治疗室上性心动过速;心得安治疗门静脉高压;灭滴灵治疗阿米巴肝脓疡以及厌氧菌感染;甘露醇静注缩小心肌梗塞面积;黄体酮治疗输尿管结石;胃复安防治晕车反应及产后乳汁过少;小剂量阿斯匹林预防脑血栓形成及心肌梗塞等等。

(二)、二线药物:指那些有一定疗效,但副作用较多,或者疗效尚不肯定的老药新用,例如:酚妥拉明治疗咯血;痢特灵治疗溃疡病;利他林治疗输液反应;甘露醇口服治疗肝硬化腹水;维生素K治疗百日咳;维生素E治疗小腿痉挛;巯甲丙脯酸治疗类风湿性关节炎;利多卡因治疗美尼尔氏病;消炎痛治疗胆道蛔虫病;双氧水治疗一氧化碳中毒及杀虫豚中毒;东莨菪碱治疗再障以及急性乙醇

中毒;烟酰胺治疗病态窦房结综合征·甘露醇口服治疗慢性胆囊炎及非梗阻性肠麻痹;镁制剂治疗心衰及哮喘;黄连素治疗室性早博;胃复安治疗糖尿病性胃痞及直立性低血压;潘生丁治疗庞状疾病、灭滴灵治疗牙周病及克隆氏病;维生素B<sub>6</sub>治疗腕管综合征等等。

(三)、第三线药物:指那些报道较少,疗效一时难以肯定,但其治疗中又无其它更好药物选择者:例如硝苯吡啶治疗贲门失弛;可乐宁治疗垂体性侏儒;赛庚啶治疗库兴氏综合征以及醛固醇增多症;甲氰咪呱治疗水痘;消炎痛治疗新生儿动脉导管未闭;苯妥英钠治疗低血糖症;安体舒通治疗女性多毛症及男性斑秃;舒喘灵保胎;精氨酸治疗男性不育症;异烟肼治疗遗传性舞蹈病;左旋咪唑治疗细胞免疫功能低下等等。

#### 参 考 文 献

- [1] 梁韶春. 药科学杂志,1984,4(6):32
- [2] 梁韶春. 山东中医药报,1987,(3):16
- [3] 刘加升等. 临床用药新知. 第一版. 学术期刊出版社,1988,150
- [4] 梁韶春. 济南西药,1990,(20)1:23
- [5] 梁韶春. 右江卫生,1984,(4):20

## 氯霉素眼药水的新用途

第二军医大学卫生处(上海 20433) 丁亚线

口腔溃疡也称口疮,可发生在口腔粘膜的任何部位,以唇、颊、舌粘膜较多见。

此病病因尚不清楚,一般认为与中枢神经功能紊乱,过度紧张,劳累及局部损伤有关。

本病的主要表现为:局部粘膜疼痛,烧灼感。溃疡呈圆形或椭圆形,表面凹陷覆有灰白色或淡黄色假膜,周围充血水肿。病人多因疼痛,进食困难,唾液增多,影响情绪而就诊。病情严重时,溃疡此起彼伏连续不

断。

目前在治疗上没有特异治疗,常用维生素B、C口服及锡类散等局部涂敷,效果均不够理想。今年以来,笔者用0.25%氯霉素眼药水局部涂敷16例,效果较好。其中年令最大的60岁,最小的18岁,均采用0.25%氯霉素眼药水局部涂敷,每天3—4次,尤其在睡前涂敷一次,效果更佳,疗效最快者1d即愈,一般2—3d均可愈合,配合应用牛黄解毒片及维生素C等药物一起治疗,效果更好。