

溶能力, 这种能力能够促进发育迅速的癌肿部分的残余纤维蛋白的溶解消除, 从而促进肿瘤的发育。止血环酸的作用机理主要是通过防止肿瘤周围的纤维蛋白溶解消除, 使其形成包裹, 从而抑制其增殖<sup>[6]</sup>。

5. 5-氟尿嘧啶(5-Fu)治疗女性尖锐湿疣 5-Fu 为尿嘧啶类抗代谢药, 多用于肿瘤的化疗。有人用其治疗 6 例女性弥漫性下生殖道尖锐湿疣, 同时伍用聚肌胞, 结果用药 2~3 周全部治愈<sup>[7]</sup>。

6. 肝泰乐治疗月经后浮肿 肝泰乐是常用的护肝药, 有人用其治疗月经后水肿, 方法为 200 mg/次, 一日 3 次, 连用 3~7 d, 治愈率达 70% 以上。本法简便易行、安全有效<sup>[8]</sup>。

7. 碳酸锂治疗月经过多 有人<sup>[9]</sup>用小剂量碳酸锂治疗月经过多症 116 例(包括子宫肌瘤合并月经过多、功能性子宫出血、子宫内膜异位症和宫内置避孕环发生月经过多), 总有效率达 75%, 以功能性子宫出血效果最好(78.8%), 其次为子宫肌瘤合并月经过多(65.9%)。

8. 维生素治疗月经过多 对放置宫内节育器(IUD)而经量增多的 20 例职工, 用维生素 E 100 mg 隔日 1 次口服, 14 d 为 1 疗程, 结果有效率达 80%。其机制为放置 IUD 者子宫内膜中过氧化氢酶的作用浓度比未放置者高, 而维生素是一种抗氧化剂, 能控制组织脂质过氧化<sup>[10]</sup>。

#### 参考文献

- [1] Ylikorkala O, Viinikka L. Acta Obstet Gynecol Scand, 1983, 133(Suppl):105
- [2] Kauppila A, et al. Prostaglandins, 1979, 18: 655
- [3] Martikainen H, et al. J Clin Endocrinol Metab, 1988, 66:987.
- [4] Barth JH, et al. J Clin Endocrinol Metab, 1989, 68:966.
- [5] Shirey DR, et al. Obstet Gynecol, 1935, 65(4):575
- [6] 堀江稔, 他. 产科と妇人科, 1985, 52(7):1196
- [7] 王建华. 临床医学, 1991(临床用药专刊):42.
- [8] 周淑琴. 江西医学院学报, 1931, 2:91
- [9] 沙福增等. 药学通报, 1983, 6:16
- [10] 上二医保健科. 上海第二医学院学报, 1985, 5(3):211

## 手持扫描仪在药学情报收集中的应用

解放军 201 医院(沈阳 111000) 隋书鹏 林一鸣

药学情报收集是一项十分重要和艰巨的工作任务。面对繁多的文字资料, 如何快速收集、贮存和传递, 已显得十分迫切和需要。笔者在微机上用手持扫描仪进行图文资料采集, 效果满意, 其方法如下。

先用手持扫描仪将有关药学情报资料扫描显示在微机屏幕上, 扫描过程中可对资料进行放大或缩小, 然后经过剪接将需要部分

存入磁盘, 可用图文管理系统进行存贮和检索。也可以将图文资料打印在卡片上, 供手工检索使用。还可以用微机拼版编辑药讯或快报。有条件的单位可以使用汉字印刷体识别系统, 将扫描录入的印刷体汉字识别成微机点阵字体, 在字处理软件支持下进行删改、编辑和打印, 从而实现了情报资料的快速采集、加工、贮存和传递。