

中译名	通用名(商品名)	研制公司(国家)	作用/适应症	首次上市国家
利芦噻唑	riluzole(Rilutek)	Rhone-Poulenc Rorer(法国/美国)	谷氨酸盐拮抗剂/运动神经元病	美国
利托那韦	ritonavir(Norvir)	Abbott(美国)	蛋白酶抑制剂/艾滋病	美国
罗平尼罗	ropinirole(ReQuip)	SmithKline Beecham(英国)	多巴胺 D <sub>2</sub> 激动剂/帕金森氏病	英国
罗哌卡因	ropivacaine(Naropin)	Astra(瑞典)	局部麻醉剂	荷兰
塞拉屈达司	sertraline(Bronica)	Takeda(丹麦)	血栓素 A <sub>2</sub> -拮抗剂/哮喘	日本
塞丁道尔	sertindole(Serdolect)	Lundbeck(丹麦)	5HT <sub>2</sub> /D <sub>2</sub> -拮抗剂/精神分裂症	英国
他利克索	talipexole(Domin)	Boehringer Ingelheim(德国)	α <sub>2</sub> D <sub>2</sub> -激动剂/帕金森氏病	日本
坦度匹朗	tandospirone(Sediel)	Sumitomo(日本)	5HT <sub>1A</sub> -部分激动剂/焦虑症	日本
噻加宾	tiagabine(Gabitril)	Novo Nordisk(丹麦)	GABA 再摄取抑制剂/癫痫	丹麦
替鲁恩那特	tiludronate(Skelid)	Sanofi Winthrop(法国)	双磷酸酯/佩吉特氏病	瑞士
托泊替坎	topotecan(Hycamtin)	SmithKline Beecham(英国)	部位异构酶 I 抑制剂/卵巢癌	美国
瓦沙坦	valsartan(Diovan)	Ciba(瑞士)	血管紧张素 II 拮抗剂/高血压	德国
瓦可他	Vacqa	Merck & Co(美国)	甲肝疫苗	德国
透明质酸钠	zafirlukast(Accolate)	zeneca(英国)	白三烯拮抗剂/哮喘	爱尔兰
托非鲁卡特	zinc hyaluronate(Curiosin)	Cedeon Richter(匈牙利)	创伤药/屈曲痛	匈牙利

## 羟氨苄青霉素致过敏性紫癜 1 例

陈瑛

(郟阳医学院诊断学教研室 十堰 442000)

羟氨苄青霉素普遍应用于呼吸道感染、泌尿系感染及消化性溃疡的治疗。未见引起过敏性紫癜的报告文献。最近,我院门诊收治一例因口服羟氨苄青霉素致过敏性紫癜,现报告如下:

患者:男,30a,因咽痛两天来我院门诊就诊,查体:T37℃一般情况好,皮肤巩膜无黄染及出血点,浅表淋巴结不大,咽部充血明显,无脓点,扁桃体未见肿大,心肺无异常,腹部无异常,四肢关节活动自如。查血常规示 RBC $3.78 \times 10^{12}/L$ 、Hb136g/L、WBC $11.1 \times 10^9/L$ 、N72.9%、BPC $138 \times 10^9/L$ ,给予口服羟氨苄青霉素片(华北制药股份有限公司生产,冀卫药准字(1994)8964号 0.25g/片)0.5tid及草珊瑚含片含服。服药当晚诉腿痛,第二天复来门诊就诊,发现双下肢出现大片紫癜及瘀斑,查 BPC $140 \times 10^9/L$ 诊断为过敏性紫癜。停用羟氨苄青霉素。经青霉素皮试阴性后给予青霉素 640 万 u,氨甲苯酸(PAMBA)0.25 静滴;口服强的松及维生素

C,3d 后痊愈、紫癜及瘀斑消退。

两月后患者又因咽痛、口服羟氨苄青霉素 0.5gtid,未服其它药物,再度出现双下肢紫癜,查 BPC $135 \times 10^9/L$ ,停用羟氨苄青霉素、青霉素皮试阴性,给予青霉素 640 万 u 静滴,口服强的松及维生素 C,两天后紫癜消退。追问病史,患者既往有土霉素、四环素过敏史、过敏性鼻炎病史,无青霉素过敏史及出血性疾病史。

讨论:患者两次紫癜的出现均在口服羟氨苄青霉素当天,无其它药物服用史,停用该药,给予激素治疗后痊愈,可见该紫癜由口服羟氨苄青霉素引起无疑。

羟氨苄青霉素引起过敏性紫癜极少见,而该药在临床应用又极为普遍,更应引起临床医生的注意。该案例提示我们,对过敏性的病人,无论青霉素皮试阴性还是阳性,在用青霉素类药物过程中均要密切观察,一旦发现异常,应立即停药,积极治疗。