

生出版社,1994;113

[2]徐淑云等. 药理实验方法学. 第1版,北京:人民卫生出版社,1982;901

[3][美]R.J. 塔拉里达 R.B. 默里著,金有豫、罗兰译,药理学计算手册. 第1版,北京:科学出版社,1985;56

[4]中国人民解放军总后勤部卫生部编. 临床疾病诊断依据治愈好转标准. 第1版,北京:人民军医出版社出版,1987;573

[5]南京医学院主编. 卫生防疫学. 第1版,上海:上海科技出版社,1980;198

## 中药制剂对扁平疣的疗效

郭随章 薛志军\*

(江苏省南通市肿瘤医院 南通 226361)

**摘要** 本文作者综述中药制剂,如中药的酊剂、煎液、洗液、合剂、冲剂、片剂以及注射剂等对扁平疣治疗而取得的疗效。

**关键词** 扁平疣治疗;中药酊剂;中药煎液;红花饮;复方大青叶合剂;柴胡注射液

扁平疣临床表现为好发于手背和颜面的帽针头至扁豆大小扁平丘疹,多数散在,呈正常皮色或微带棕色,中医称之为“扁瘕”。中药制剂治疗扁平疣,取得较佳疗效,现综述如下。

### 一、中药酊剂

刘文礼等<sup>[1]</sup>用山豆根、香附、百部、木贼各30g,研碎后加入75%酒精1000ml中,浸泡1wk后过滤,取其上清液加入10%月桂氮唑酮,分装(10ml/瓶)用时用棉签沾药涂擦于疣体表面,早晚各1次,涂擦至皮损部微红或灼痛感为度,结果在治疗86例扁平疣患者中,痊愈17例(19.76%),显效35例(40.70%),好转22例(25.58%),无效12例(13.95%),总有效率为86.05%,比对照组阿昔洛韦霜63.4%的总有效率高。

### 二、中药煎液

钱龙宝等<sup>[2]</sup>用木贼草、制香附各50g,加水1000ml,煎至500ml,冷却至温热(30~40℃)后,用此药擦洗皮损部位15min, Bid, 10d为1疗程。结果76例扁平疣患者经治愈的有63例(82.89%),显效9例(11.84%),好

转4例(5.26%),总有效率为100%。

### 三、洁尔阴洗液

石年等<sup>[3]</sup>用四川成都恩威制药有限公司产的洁尔阴洗液[(93)卫药准字Z-32号;其主要成分是蛇床子、艾叶、独活、石菖蒲、苍术等]涂擦疣体表面, Bid, 约3~5d后有痂形成,反复涂擦,2wk为1疗程,结果经治的182例扁平疣患者中痊愈12例(6.59%),显效71例(39.01%),好转76例(41.75%),无效23例(12.63%),总有效率87.37%。

### 四、复方大青叶合剂

夏文华等<sup>[4]</sup>给143例扁平疣患者口服复方大青叶合剂,10ml/次, tid, 并将药液外擦患者, Bid, 结果治愈106例(74.12%),显效11例(7.69%),有效16例(11.19%),无效10例(6.99%),总有效率为93.01%,比口服乌洛托品的对照组总有效率76%高。

### 五、红花饮

李维<sup>[5]</sup>用开水泡红花(12g/d)代茶饮(至无色弃去),治疗扁平疣,15d为1疗程,一般口服1~2个疗程,结果356例中痊愈259例,无效97例,治愈率为72.75%,在服药过程中感觉局部发红,发热、微痒,其它均正常。

### 六、云芝肝泰冲剂

\* 江苏省南通市医药采购供应站 南通 226006

宛树军等<sup>[6]</sup>用云芝肝泰冲剂治疗儿童扁平疣,5g/次,tid,连服 1mo 为 1 疗程,结果治疗 32 例,治愈 12 例(37.5%),有效 17 例(53.12%),无效 3 例(9.38%),总有效率为 90.62%,比板兰根注射液对照液组的总有效率 70.0%高。

### 七、平消片(胶囊)

唐亚娟等<sup>[7]</sup>用西安国药厂生产的中成药平消片(胶囊),口服治疗典型的扁平疣,8 片/次,tid,10d 为 1 疗程,共 4 个疗程。结果 80 例中痊愈 10 例(12.5%),显效 52 例(65%),有效 2 例(2.5%),无效 16 例(20.0%)。治愈率 12.5%,总有效率 80%,比对照组聚肌胞的治愈率 5%和总有效率 20%高。平消片的主要成分为郁金、枳壳、五灵脂、仙鹤草、火硝和马钱子等,其具有活血化瘀,止痛散结,清热解毒,扶正祛邪等功用。

### 八、中药注射液

#### (一)柴胡注射液

解晓宪等<sup>[8]</sup>用柴胡注射液治疗扁平疣,外涂疣体表面,轻揉 3~5min,2 次/d,7~10d 为 1 疗程。治疗 54 例,痊愈 35 例(64.81%),好转 16 例(29.62%),无效 3 例(5.55%),与对照组用消疣灵注射液,15 例中痊愈 10 例(66.66%),好转 4 例(26.66%),无效 1 例(6.66%),两组无明显差异。袁翠英等<sup>[9]</sup>用柴胡注射液治疗多种方法治疗效果不佳或复发的扁平疣患者 39 例,从母疣边缘进针,局封,依皮疹大小,每次注射 0.2~0.5ml,致疣体发白,1wk 后根据皮疹变化再决定是否继续注射,结果痊愈 35 例(89.74%),显效 4 例(10.25%),最多使用 8 次,总有效率 100%。王荣光等<sup>[10]</sup>用柴胡注射液湿敷于手、颈、面部治疗数年之久的扁平疣,20 例中用药 7d,扁平疣消失 10 例,用药 8d 消失 5 例,用药 9d 消失 5 例。

#### (二)华蟾素注射液

毛东军<sup>[11]</sup>用华蟾素注射液治疗扁平疣 54 例,2 次/d,每次 1~4ml 根据(患者不同的临床表现,采用不同的剂量),连用 10d,结果痊愈 9 例(16.67%),显效 2 例(3.7%),有效 18 例(33.33%),无效 25 例(46.29%),总有效率为 53.7%。

#### (三)香附注射液

谢郭华等<sup>[12]</sup>提取香附中的有效成份制成注射液(每支 2ml 相当于原生药 3g)隔日肌注 4ml,儿童酌减,一般以 10~15 次为 1 疗程,观察 4~6mo,治疗 140 例中,治愈 106 例(75.71%),减轻 14 例(10%),无效 20 例(14.28%),总有效率为 85.72%。

#### 参考文献

- [1]刘文礼,曾晓艳,涂彩霞. 中药酊剂加月桂氮唑酮治疗扁平疣 86 例. 临床皮肤科杂志,1994;23(5):291
- [2]钱龙宝,范志莘. 外用中药煎液治疗 76 例扁平疣的疗效观察. 临床皮肤科杂志,1994;23(4):184
- [3]石年,谢汉平,熊宗英. 洁尔阴治疗扁平疣 182 例临床观察. 临床皮肤科杂志,1992;21(增刊):61
- [4]夏文华,王喜有. 复方大青叶合剂治疗扁平疣 143 例报告. 临床皮肤科杂志,1992;21(3):165
- [5]李维. 红花饮治疗扁平疣 356 例疗效观察. 临床皮肤科杂志,1989;18(2):108
- [6]宛树军,田德英,佟春芳,等. 云芝肝泰治疗儿童扁平疣 32 例. 中国医院药学杂志,1995;15(7):325
- [7]唐亚娟,邹惠秋,邱丙森. 平消片治疗扁平疣疗效观察. 临床皮肤科杂志,1993;22(1):45
- [8]解晓宪,宋雪萍. 柴胡注射液外用治疗扁平疣 54 例. 临床皮肤科杂志,1993;22(6):333
- [9]袁翠英. 柴胡注射液局部治疗扁平疣 39 例. 中国中西医结合杂志,1992;12(4):212
- [10]王荣光,叶春生,马忠. 柴胡注射液湿敷治疗扁平疣 20 例. 实用医学杂志,1991;7(3):155
- [11]毛东军. 华蟾素注射液治疗扁平疣. 临床皮肤科杂志,1992;21(5):239
- [12]谢郭华,庄宗镇. 香附治疗扁平疣的临床研究. 临床皮肤科杂志,1990;19(2):103