

肝功能损害,停药后2~4wk内肝功能均恢复正常。

9 致脱发

杨贤俊等^[10]报道1例37a男性十二指肠溃疡患者,口服雷尼替丁150mg, bid, 27d后头发脱落,可见头皮面积为8cm×8cm,停药后45d头发恢复生长,4mo后恢复原样。再次口服雷尼替丁100mg, bid, 40d时头顶头发又逐渐脱落,面积为9cm×9cm,停药后又逐渐生长。

综上所述,雷尼替丁除常见的消化系统不良反应和皮疹、瘙痒外,还能引起过敏性哮喘、精神异常、视物模糊、房室传导阻滞、血小板减少性紫癜、生精功能障碍、泌乳、尿崩、脱发等特殊不良反应。本文提示临床应用雷尼替丁时要注意密切观察,尤其是对于肝、肾功能不全者和老龄患者,用药剂量应进行调整,对肾衰患者剂量为75mg, qd即可达到有效治疗浓度,不良反应发生率亦可降低。

参考文献

- 1 卫淑芳, 柳立平. 吸入雷尼替丁粉尘致过敏性哮喘1例. 中国医院药学杂志, 1993, 13(4): 190
- 2 蒙燕清. 静滴雷尼替丁致精神异常1例. 中国医院药学杂志, 1996, 16(8): 380
- 3 陈召晖, 夏尚全, 辛俊等. 雷尼替丁引起视物障碍1例. 药学实践杂志, 1997, 15(3): 179
- 4 刘怀霖. 雷尼替丁致房室传导阻滞1例. 新药与临床, 1991, 5(10): 276
- 5 郝京允, 李玉珍. 雷尼替丁致血小板减少性紫癜1例. 中国医院药学杂志, 1995, 15(6): 279
- 6 陈拥军, 包勇. 口服雷尼替丁致生精功能障碍2例. 中国医院药学杂志, 1996, 16(7): 330
- 7 赵志超. 口服雷尼替丁致泌乳2例. 新药与临床, 1993, 12(3): 158
- 8 郭业军, 张树生. 雷尼替丁引起尿崩症1例. 实用医学杂志, 1992, 8(5): 24
- 9 陈正言. 雷尼替丁致药物性肝功损害25例分析. 中国医院药学杂志, 1994, 14(12): 563
- 10 杨贤俊, 丁兆平. 雷尼替丁致脱发1例. 药学实践杂志, 1995, 13(4): 320

(收稿: 1998-09-24)

藿香正气水引起呼吸困难1例

舒晓敏 陈云花(武警江西总队医院 南昌 330001)

藿香正气水主要用于四时外感、中暑头晕、腹胀腹痛、呕吐、泄泻等疾病。其不良反应少有报道,笔者在应用过程中遇见该药引起呼吸困难1例,现报告如下:

1 临床资料

患者黄某,男,20a,因头昏胸闷、乏力、轻度腹泻于1998年8月20日入门诊留治观察。查体温37℃,呼吸16次/min,血压16/10kPa,心肺肝脾无异常,血常规、尿、大便均正常。诊断:先兆中暑。予以藿香正气水(江西汇仁制药厂,批号980708),10ml口服, bid, 首次po30min后,患者渐感呼吸急促,头晕头痛、胸闷、口唇紫

绀,立即平卧,给O₂,静推地塞米松10mg,10min后呼吸逐渐平稳,紫绀消失,后改为十滴水10mlpo, bid, 2d后痊愈。

2 讨论

藿香正气水为纯中药制剂,在预防和治疗夏季中暑有着良好的疗效,不良反应未见报道,该病人无药物过敏史及其他病史,以前曾服过此药,此次服药后30min出现呼吸困难,考虑为速发型变态反应,此处方中的藿香、白术、半夏、桔梗等中药未见有不良反应的报道,故该病例发病机理有待进一步研究验证。

(收稿: 1998-10-26)