

吲哚美辛栓引起虚脱 1 例报告

陈洪瑞 王宝华(胶州市第四人民医院 胶州 266300)

1 临床资料

患者,男,59a,经诊断为肺癌晚期,于 1998 年 2 月 10 日入院。因患者体温高达 39.9℃,遂行物理降温,同时给予吲哚美辛栓 1 枚(芜湖长江药业有限公司生产,批号 970116,每枚含吲哚美辛 25mg),患者体温方逐渐降为正常。次日患者体温又升至 40.1℃,即又给予吲哚美辛栓 1 枚。1h 后,病人大汗淋漓,面色苍白,四肢发凉,体温降至 35℃,经对症抢救治疗后患

者方恢复正常。

2 讨论

患者用吲哚美辛栓引起虚脱,可能与其长期卧床,大手术后体质虚弱,体温调节能力差有关,也可能是前期用物理降温合用吲哚美辛后再用吲哚美辛所致的降温过度,提示此类病人应慎用或减量使用吲哚美辛。

(收稿:1998-10-12)

口服布洛芬过量中毒性反应 1 例

施志云(海军青岛疗养院 青岛 266071)

1 病例介绍

患者:女,45a。1998 年 5 月 7 日晨,因右侧头痛于早饭后口服布洛芬缓释胶囊 300mg×3 粒(芬必得,中美天津史克制药有限公司,批号 96100468)。服药后 0.5h,患者自觉出汗,腹胀、心慌、头痛;1h 后,自觉恶心,想吐,腹胀痛,腹泻,头痛剧烈;2h 后,恶心并有喷射状呕吐,腹部胀痛加剧,全身乏力,心慌,眩晕,头部呈炸裂样疼痛。查体,体温 37℃,脉搏 76 次/min,血压 17.5/10.5kPa,神志不清,急性痛苦病容。即对症治疗,停用本药,口服甲氧氯普胺片 10mg,溴化丙胺太林片 30mg,口服补液盐 13.95g, tid。至次日晨,上述症状逐渐消失,但仍有轻微头痛和眩晕。

2 讨论

布洛芬是消炎镇痛药,其消炎镇痛、解热作用较好,副作用较少,故临床应用较广。其不良

反应^[1]有:偶见轻度消化不良,皮疹,胃肠道溃疡及出血,氨基转移酶升高。涉及胃肠道系统的不良反应高达 30%,有各种胃肠道刺激症状,恶心、呕吐、厌食、腹痛等。中枢神经系统不良反应也极为常见^[2],其中头痛、眩晕、耳鸣和失眠发生率最高。该患者自诉无溃疡等胃肠道疾患,近日除服布洛芬缓释胶囊外,未服其它药物;过去曾因头痛多次服用布洛芬缓释胶囊,1 次量 600mg,无不良反应。此次由于服用量高达 900mg,显然是因用量过大,引起胃肠道系统和中枢神经系统的药物中毒性反应。

参考文献

- 1 陈新谦,金有豫.新编药理学.第 14 版.北京:人民卫生出版社,1998.160
- 2 王士凡,孙定人.药物不良反应.北京:人民卫生出版社,1988.308

(收稿:1998-10-12)