

# 口服红霉素致口唇红肿 1 例

杜长茹(空军北戴河疗养院, 北戴河 066100)

关键词: 红霉素; 过敏反应

中图分类号: R978.1<sup>+</sup>5

文献标识码: D

文章编号: 1006-0111(2000)06-0395-1A

## 1 临床资料

患者, 男性, 36a, 主因咽喉肿痛, 咳嗽声音嘶哑, 于 1998 年 8 月 18 日来我院就诊。诊断为上呼吸道感染。po 红霉素 0.5g, 4 次/d。服用 2d 后患者自觉口唇麻木, 继之出现红肿、热痛、手心瘙痒。患者 8 月 20 日再次来我院就诊, 检查血压、脉搏以及呼吸均正常, 就诊期间未服其它药物, 无既往药物过敏史。诊断为口服红霉素过敏, 停服红霉素, po 息斯敏 1 片, 症状好转, 但 24h 后上述症状又加重, 继续 po 息斯敏 1 片, 1 次/d, 服药 3d 后症状消失痊愈。

## 2 讨论

本药的不良反应一般较少, 口服大剂量时

可出现胃肠道刺激作用, 偶有药疹、发热等过敏反应; 红霉素本身不引起黄疸, 而红霉素丙酯十二烷基硫酸盐则可引起胆汁郁积性黄疸, 但停药 2~3d 后可转为正常。iv gtt 乳酸红霉素浓度较高或速度较快, 可发生疼痛和静脉炎, 给灼伤病人应用后, 易发生血栓性静脉炎。本例 po 红霉素出现口唇红肿、热痛、手心瘙痒, 此类副作用比较少见。笔者认为患者属于对红霉素高度过敏者。建议临床对红霉素使用应询问患者过敏史, 对高度过敏者忌用。一旦发现过敏性应立即停药, 同时给予抗过敏药治疗。

收稿日期: 2000-04-09

# 香砂养胃丸致急性过敏性荨麻疹 1 例

马坤铭, 赵宁志(83483 部队卫生所, 南京 210003)

关键词: 香砂养胃丸; 急性过敏性荨麻疹

中图分类号: R978.69

文献标识码: D

文章编号: 1006-0111(2000)06-0395-1B

## 1 临床资料

患者, 男, 25a。因胃脘部胀痛、食欲减退来卫生所就诊。检查无外科急腹症体征, 既往有“胃病史”, 给予香砂养胃丸(河南宛西制药股份有限公司生产, 批号: 991014), 每次 8 粒, po, tid。即刻服用 8 粒, 服药后不到 1h 即出现头晕、咽干、全身瘙痒, 立即来所复诊, 检查发现患者全身有散在突出皮肤表面的红色风疹块, 询问患者事先并未服用其他药物, 故考虑为服用香砂养胃丸引起的急性过敏性荨麻疹。当即 po 息斯敏 1 片, im 异丙嗪 25mg, 0.5h 后症状未缓解, 并出现恶心、呕吐、面色苍白等症状, 再次复诊。经检查后立即给予地塞米松 10mg 加

10% 葡萄糖注射液 500ml, iv gtt, 1h 后, 患者皮肤荨麻疹完全消退, 恶心呕吐症状消失, 自我感觉良好。

## 2 讨论

香砂养胃丸系中成药, 有木香、砂仁、白术、陈皮、茯苓、半夏、香附、枳实等 14 味中药组成。其功能与主治, 温中和胃, 用于不思饮食、呕吐酸水、胃脘满闷、四肢倦怠。此次患者服用的香砂养胃丸, 以往在临床上多次使用, 从未出现明显副作用。就此, 笔者认为, 在使用此药时应询问药物过敏史, 并提醒医护人员引起重视, 以减少不良反应的反应。

收稿日期: 2000-05-17