

书的完善,使病人真正放心地使用药品,使传统中医药得以健康的发展。《药品管理法》总则指出:“国家发展现代药和传统药”。1996 年的全国卫生工作会议上又明确提出“既要认真继承中医药的特色和优势,又要勇于创新,积极利用现代科学技术,促进中医理论和实践的发展,实现中医药现代化”。此形势下,各制药企业取得了不同的进步,但由于条件和重视程度的不同,差距仍较大,如国产中药针剂部

分不良反应出现率非常低,亟待规范。如常用药注射剂柴胡针就缺少不良反应、禁忌症、注意事项。总之,药品说明书的规范化任重道远,它既需要引起制药企业的足够重视,更需要工商、医药卫生、药品监督等部门齐抓共管。唯此,才能使用药安全、有效,造福患者。

收稿日期:2003-01-06

· 药物不良反应与相互作用 ·

参芪扶正注射液致过敏反应 2 例

迟翠华¹, 何云霞², 张云玲²(1. 成都军区昆明疗养院, 云南 昆明 650307; 2. 成都军区昆明总医院, 云南 昆明 650032)

中图分类号:R979.1

文献标识码:D

文章编号:1006-0111(2003)03-0179-01

1 临床资料

病例 1: 男, 65 岁, 因左侧胸膜间皮瘤住院。于 2002 年 10 月 18 日给予参芪扶正注射液 250mL(丽珠集团利民制药厂, 批号: 020857), 输液完毕后, 即感全身发抖、寒颤, 双侧下肢麻木, 查体: BP 14/10kPa, P 130 次/min, 面色苍白, 余无明显阳性体征。即给予患者盐酸异丙嗪注射液 25mg, im; 并密切观察病情。30min 后症状缓解。患者还使用长链脂肪乳注射液、盐酸氨溴索片(商品名: 沐舒坦片)及盐酸吗啡控释片(商品名: 美施康定片)多日, 未发生不良反应。

病例 2: 女, 62 岁, 因肺癌并骨转移入院。于 2002 年 10 月 29 日给予参芪扶正注射液 250mL(丽珠集团利民制药厂, 批号: 020857), 输液完毕后, 患者感面部及颈部瘙痒, 次日晨起发现瘙痒部位出现红色丘疹, 立即停用该药, 并给予马来酸氯苯那敏片(商品名: 扑尔敏片)5mg, 3 次/日, 症状 1 周后缓解, 15d 后消失。

2 讨论

参芪扶正注射液主要成分为党参、黄芪, 可以益气扶正, 改善患者免疫功能, 改善气虚症状并提高患者生活质量, 用于癌症的辅助治疗。本品的使用应认真辨证用于气虚患者。

近年来, 中药注射剂, 如双黄连注射液、清开灵注射液等, 发生过敏反应的病例时有报道^[1-4], 目前认为中药注射剂发生不良反应的主要原因有^[2,4]: ①机体对药物过敏; ②药物的刺激性; ③制剂提取不纯, 含有较大的微粒或混有热原; ④输液操作造成的污染等。其不良反应主要表现为皮肤过敏反应、消化道反应及类热原样反应。本文报道的病例, 可能与患者长期患有癌症, 身体虚弱, 对药物耐受差, 同时制剂提取不纯等因素有关。

以上 2 例再一次说明, 与口服中药制剂较少发生不良反应不同, 在使用中药注射剂时, 一定要严格其辨证治疗范围, 并在输注过程中密切观察, 以防不良反应造成损害。

参考文献:

- [1] 方丽莎, 李 蕾, 尚北城. 双黄连注射液致过敏性休克 1 例[J]. 军队医药, 2000, 10(4): 57.
- [2] 尤卫平. 双黄连针不良反应 32 例. 浙江中西医结合杂志[J], 2002, 12(2): 80.
- [3] 赵 娟, 程银萍, 王儒柳. 清开灵注射液静滴过敏反应 8 例[J]. 中国临床医生, 2002, 30(3): 52.
- [4] 林小明. 清开灵注射液致不良反应临床分析[J]. 时珍国医国药, 2002, 13(8): 501.

收稿日期:2003-03-11